


# 農薬使用基準

## ◆パッケージ等へのガイドライン表示

JA あしきたでは、「サラたまちゃん」の出荷パッケージ等に、下記ガイドラインを表記しています。

農林水産省新ガイドラインによる表示	
特別栽培タマネギ	
節減対象農薬 化学肥料（窒素成分）	当地比 5割減 当地比 5割減
栽培責任者	あしきた農業協同組合 サラたまちゃん部会 部会長：田畑 和雄 所在地：熊本県葦北郡芦北町大字佐敷424 連絡先：0966-82-4874
確認責任者	あしきた農業協同組合 サラたまちゃん選果場 所在地：熊本県水俣市大迫750 連絡先：0966-63-4482
節減対象農薬の使用状況 ホームページ： <a href="http://www.ja-ashikita.or.jp">http://www.ja-ashikita.or.jp</a>	



- ※「サラたまちゃん」生産者は、消費者の皆様方に生でも安心して食べて頂けるよう、栽培期間中除草剤を一切使用していません。（手作業による除草のみ）
- ※熊本県のたまねぎ慣行レベルは、2月～4月は14成分、5月～6月は18成分。

## ◆節減対象農薬一覧

以下の農薬から7成分以内を使用しています。

農薬名	用途	項目	成分名	成分 加外数	倍数	使用 時期
オーソサイド水和剤 80	殺菌	葉付	キャプタン	1	600倍	収穫7日 前まで
ランマンフロアブル	殺菌	葉付	シアゾファミド	1	2000倍	収穫7日 前まで
ロブラール水和剤	殺菌	葉付	イプロジオン	1	1000倍	収穫14日 前まで
アミスター20フロアブル	殺菌	葉付	アゾキシストロピン	1	2000倍	収穫3日 前まで
ドイツボルドーA	殺菌	葉付 切玉	塩基性塩化銅	0	500倍	収穫前日 まで
ハーモメイト水溶剤	殺菌	葉付 切玉	炭酸水素ナトリウム	0	800倍	収穫前日 まで
ランマンフロアブル	殺菌	切玉	シアゾファミド	1	2000倍	収穫7日 前まで

農薬名	用途	項目	成分名	成分 加外数	倍数	使用 時期
ロブラール水和剤	殺菌	切玉	イプロジオン	1	1000倍	収穫7日 前まで
アミスター20フロアブル	殺菌	切玉	アゾキシストロピン	1	2000倍	収穫前日 まで
ダコニール1000	殺菌	切玉	TPN	1	1000倍	収穫7日 前まで
ジマンダイセン水和剤	殺菌	切玉	マンゼブ	1	400～600倍	収穫3日 前まで
フェスティバルC水和剤	殺菌	切玉	ジメトモルフ 塩基性塩化銅	1	600～800倍	収穫7日 前まで
リドミルゴールドMZ水和剤	殺菌	切玉	マンゼブ メタラキシル	2	1000倍	収穫7日 前まで
プロポーズ顆粒水和剤	殺菌	切玉	ベンチアバリカルブイソプロピル TPN	2	1000倍	収穫7日 前まで
デルフィン顆粒水和剤	殺虫	葉付 切玉	BT剤	0	1000倍	収穫前日 まで
ダイアジノン粒剤	殺虫	葉付 切玉	ダイアジノン	1	3～5kg/10a	播種 定植時

## ◆節減対象農薬の使用状況（使用例）

### ≪ 葉付 ≫

使用資材名	用途	使用回数
キャプタン	殺菌	1
BT剤	殺虫	1
イプロジオン	殺菌	1

※使用資材名は、原則として商品名ではなく主成分を示す一般的名称を表示します。

### ≪ 切玉 ≫

使用資材名	用途	使用回数
TPN	殺菌	1
マンゼブ	殺菌	2
ジメトモルフ	殺菌	1

※使用資材名は、原則として商品名ではなく主成分を示す一般的名称を表示します。